

Relato de caso: *Lip Lifting* do lábio superior como técnica cirúrgica para tratamento de CBC nodular em paciente com alargamento da porção cutânea do lábio superior

Introdução

Caso
Clínico

Lip Lifting de
Lábio
Superior

Considerações
Finais

Conduta
Cirúrgica

Instituto de Dermatologia Prof. Rubem David Azulay
Dr. Gabriel Leal

Orientadores: Dr. Leonardo Rotolo, Dra. Maria Carolina Zafra, Dr. Leonardo Quintella e Dr. David Azulay

Motivos da Apresentação

Demonstrar uma indicação cirúrgica para tratamento de lesões como o CBC nodular na região infranasal em pacientes com queixa de inversão e alongamento do lábio superior

Caso Clínico

Identificação

J.M.E.S, 72 anos, feminina, caucasiana, procedente do RJ, aposentada

HPP

HAS

HCTZ, Atenolol, Pantoprazol

Alergia a Novalgina (SIC)

Cirurgias Pregressas:

CBC Esclerodermiforme em glabella (08/21)

Cisto Epidérmico no dorso (07/21)

HDA

Exame
Físico

Avaliação
da
Conduta

HDA

QP: Caroço no nariz crescendo há 2 meses

Paciente relata surgimento de lesão papulosa, esbranquiçada, assintomática, na região infranasal de longa data, que evoluiu em tamanho nos último 2 meses (SIC). Não realizou tratamento tópico, biópsia ou exérese cirúrgica das lesões anteriormente.

| Exame Clínico

Lesão papulonodular eritematosa, bem delimitada, com brilho perolado e móvel, medindo cerca de 4mm de diâmetro no sub-násio



| Dermatoscopia

Brilho perolado, múltiplos vasos arboriformes, ninhos ovoides e crisálidas



Avaliação da Conduta

HD: CBC nodular



Conduta: Exérese
cirúrgica



**Avaliação da
Conduta**

Avaliação da Conduta

- Aumento da distância sub-násio > lábio superior
- Lábio superior invertido
- Rugas periorais acentuadas
- Rebaixamento do estômio em relação ao alinhamento dentário
- Recrutamento de musculatura acessória para abertura da boca




Lip Lifting de Lábio Superior

- Excisão cirúrgica em faixa de camada de pele e de gordura subcutânea infranasal
- Incisão em asa de gaivota da região cutânea do lábio superior
- Marcação dos principais pontos de referência do lábio (limite superior do lábio superior, filtro e arco do cupido) realizando marcação linear simétrica entre as asas nasais e columela
- Elevação
- Eversão
- Encurtamento

Parâmetros


Paciente




(The Modified Bullhorn Approach for the Lip-lift." JAMA Facial Plastic Surgery, 21(1), pp. 69-70)

Parâmetros

- Elevação do ângulo nasolabial



- Alargamento da porção cutânea do lábio superior



- Enrugamento da região perioral
- Apagamento do filtro
- Inversão do vermelhão

Paciente

- **Elevação do ângulo nasolabial: 120 graus**
- Enrugamento da região perioral
- Apagamento do filtro
- Inversão do vermelhão
- **Alargamento da porção cutânea do lábio superior: 25mm**





Conduta Cirúrgica

- Marcação da lesão com definição de margem de excisão (3-4mm)
- Anestesia local (Solução 10ml Lido + 10ml SF 0,9% + 0,3ml de NE): 7ml de solução
- Marcação da incisão em asa de gaivota




Atenção



Conduta Cirúrgica

- Incisão com bisturi lâmina 15 a 45 graus



Conduta Cirúrgica

- Retirada da marcação em bloco (10mm)
- Divulsão dos tecidos ao redor da marcação




Conduta Cirúrgica



Conduta Cirúrgica

- Fio mononylon 6.0
- Fechamento pontos simples (baixa tensão)



Pós-cirúrgico




Imediato




15 dias

Histopatologia

- Células basaloides em arranjo agrupado com formação de paliçada periférica compatível com CBC Nodular do tipo sólido com componente adenoide



Resultado



● Pré-cirúrgico



● 30 dias

Considerações Finais

- Avaliar sempre os pacientes caso a caso
- Buscar realizar o diagnóstico adequado afim de obter o melhor planejamento terapêutico
- Levar em consideração as técnicas cirúrgicas para melhor resultado estético e funcional dos pacientes

**Referências
Bibliográficas**

Referências Bibliográficas

- A Paixão, Maurício MD; Montedonio, Josue MD; Filho, Wail MD; Lifting de lábio superior associado à dermabrasão mecânica: August 2018 - Surgical and Cosmetic Dermatology
- The Modified Bullhorn Approach for the Lip-lift." JAMA Facial Plastic Surgery, 21(1), pp. 69-70
- Braz, André MD; Lower Face, Plastic and Reconstructive Surgery: November 2015 - Volume 136 - Issue 5S - p 235S-257S
- Cardim VLN, Silva AS, Salomons RL, Dornelles RFV, Blom JOS, Silva ALe. Lifting nasolabial com realce do vermelhão. Rev. Bras. Cir. Plást.2011;26(3):466-477
- Ramirez, O.M., Ileri, U. (2015). Upper Lip Lift: A Powerful Rejuvenative Procedure. In: Hartstein, MD, FACS, M., Massry, MD, FACS, G., Holds, MD, FACS, J. (eds) Pearls and Pitfalls in Cosmetic Oculoplastic Surgery. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1544-6_175



Muito Obrigado!