



Lesões areolares bilaterais

Nanda Altieri Cardoso Silva
Laís Martins da Costa Miranda
Diego Rocha
Ricardo Barbosa Lima
Luciana Ferreira de Araújo
Carlos José Martins

Anamnese

Identificação:

Homem, 47 anos, natural e procedente do Rio de Janeiro-RJ;

Queixa principal:

"Manchas nos mamilos".

Anamnese

História da doença atual:

Paciente relatava surgimento há 02 anos de lesão acastanhada levemente pruriginosa na aréola esquerda com crescimento progressivo. Posteriormente, apresentou lesão semelhante na aréola contralateral;


História patológica pregressa:

Epilepsia em uso regular de Fenobarbital.



Exame físico



Exame físico





Dermatoscopia



Mama direita

Dermatoscopia



Mama esquerda

Hipóteses diagnósticas

Doença de Fox-Fordyce

Dermatose terra firme-forme/dermatose neglecta

Acantose nigricante

Doença de Paget (variante pigmentada)

Conduta


Tentativa de remoção das lesões com solução alcoólica



Biópsia incisional (aréola esquerda)



Histopatológico



Hiperceratose
ortoceratótica

Alongamento e
fusão de
cones epidérmicos

Pseudocistos
córneos

Ceratose seborreica



Lesões
bilaterais e
simétricas

Paciente
jovem

Fotodano
discreto

Área
comumente
fotoprotegida





Hiperceratose nevoide do mamilo e da aréola

> J Am Acad Dermatol. 2002 Mar;46(3):414-8. doi: 10.1067/mjd.2002.119646.

Nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola: a distinct entity

Can Baykal¹, Nesimi Büyükbabani, Ayse Kavak, Murat Alper

Review

> Int J Dermatol. 2002 Nov;41(11):775-7. doi: 10.1046/j.1365-4362.2002.01656.x.

Nevoid hyperkeratosis of the nipple and/or areola: a report of two cases and a review of the literature

¹, Tiffany A Angel, Tom R Roark, Sylvia Hsu

> J Cutan Aesthet Surg. 2011 Sep;4(3):214-5. doi: 10.4103/0974-2077.91258.

Unilateral Nevoid/primary Hyperkeratosis of Nipple and Areola Successfully Treated with Radiofrequency Ablation

Prashant Verma¹, Deepika Pandhi, Pravesh Yadav

Case Reports

> Clin Exp Dermatol. 2015 Jan;40(1):23-6. doi: 10.1111/ced.12461.

Epub 2014 Sep 23.

Naevoid hyperkeratosis of the nipple and areola: an extensive form in two adolescent Filipino females

¹, M E Piansay-Soriano

Case Reports

> Dermatol Online J. 2016 Feb 17;22(2):13030/qt9bp2r6pt.

Nevoid hyperkeratosis of the nipple and the areola

Maria Jose Alonso-Corral¹, Cristina Garrido-Colmenero, Fernando Martinez-Ortiz, Ricardo Ruiz-Villaverde

Case Reports

> JAAD Case Rep. 2016 Dec 7;2(6):500-501. doi: 10.1016/j.jdc.2016.09.007.

eCollection 2016 Nov.

Nevoid hyperkeratosis of the nipple mimicking a pigmented basal cell carcinoma

Marina Mazzella¹, Claudia Costa¹, Gabriella Fabbrocini¹, Giovanni Francesco Marangi², Maria Laura Russo³, Francesco Merolla³, Massimiliano Scalvenzi¹

Case Reports > Skin Health Dis. 2024 Jan 27;4(2):e344. doi: 10.1002/ski2.344.

eCollection 2024 Apr.

Bilateral hyperkeratosis of the nipples and areolae with linear nevus and acanthosis nigricans: A rare case report

Rui-Ni Wang¹, Ping-Shun Zhang¹, Xiao-Fang Zhu²

Save

Email

Send to

Sort by: Most recent



Display options 

RESULTS BY YEAR


113 results

<< < Page 1 of 1 > >>



1936

2024



Hiperceratose do mamilo e da aréola

- Alteração **incomum e adquirida** que acomete os mamilos e as aréolas;
- Relatada pela primeira vez por Tauber et al em 1923;
- Origem ainda incerta.



Nevo epidérmico manifestando-se como hiperqueratose do mamilo e aréola

Verrucous epidermal nevus manifesting as nipple and areola hyperkeratosis

ROBERTO RHEINGANTZ DA CUNHA FILHO¹, HIRAM LARANGEIRA DE ALMEIDA JR.², ANDRÉ DA SILVA CARTELL³

¹Mestre em Saúde e Comportamento pela Universidade Católica de Pelotas - UCPel - Pelotas (RS); Médico Dermatologista no Centro de Especialidades Médicas de Joaçaba - CEM - Joaçaba (SC), Brasil.

²Doutor em Dermatologia, Professor de Dermatologia da Universidade Federal de Pelotas - UCPel - e da Universidade Católica de Pelotas - Pelotas (RS); Professor e Coordenador do Programa de Pós Graduação - Mestrado em Saúde e Comportamento da Universidade Católica de Pelotas - Pelotas (RS), Brasil.

³Professor de Patologia Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Porto Alegre (RS), Brasil.

Recebido em 11.01.2005. Aprovado pelo Conselho Consultivo e aceito para publicação em 13.06.2006. Trabalho realizado na Universidade Católica de Pelotas - UCPel Universidade Federal de Pelotas - Pelotas (RS), Brasil.

Hiperceratose do mamilo e da aréola

Classificada em 3 subtipos por Levy-Frenckel em 1938:

Tipo I: associada a nevo epidérmico;


Tipo II: associada a outras dermatoses (doença de Darier, dermatite atópica, ictioses, acantose nigricante);

Tipo III (nevoide): idiopática.

Hiperceratose nevoide do mamilo e da aréola

- Mulheres na segunda e terceira décadas de vida;
- Benigna e de etiologia pouco conhecida;
- Questiona-se associação com alterações hormonais:
 - Surgimento após menarca ou durante gestação;
 - Acometimento de homens em uso de hormonioterapia.

Hiperceratose nevoide do mamilo e da aréola




Ghanadan A et al. Nevoid Hyperkeratosis of the Nipple and/or Areola: Treatment with Topical Steroid. Indian J Dermatol. 2013.




Sander D et al. Hyperkeratosis of the nipple and areola: a histopathologic pitfall. J Dtsch Dermatol Ges. 2018.

Hiperceratose nevoide do mamilo e da aréola




Claudio C et al. Dermoscopic features of nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola. Dermatol Pract Concept. 2022.



Huang Q et al. Dermoscopy and Histopathology of Hyperkeratosis of Nipple and Areola: A Case Report. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2024.

Hiperceratose nevoide do mamilo e da aréola



Pseudoaberturas foliculares


Pseudocistos

Hiperceratose nevoide do mamilo e da aréola

Achados histopatológicos:

Inespecíficos

- Hiperceratose ortoceratótica;
- Acantose filiforme;
- Cones epidérmicos alongados e fusionados;
- Papilomatose;
- Hiperpigmentação da camada basal.



Hiperceratose nevoide do mamilo e da aréola

Tratamento:

- Agentes tópicos (queratolíticos, corticosteroides, calcipotriol);
- Crioterapia;
- Exérese por shaving;
- Laser de CO₂.

Motivos da apresentação

- Ilustrar uma dermatose benigna pouco conhecida;
- Relatar um caso de hiperkeratose nevoide do mamilo e da aréola com epidemiologia atípica;
- Ressaltar a importância da correlação clínico-histopatológica para o diagnóstico correto.

Motivos da apresentação

- Ilustrar uma dermatose benigna pouco conhecida;
- Relatar um caso de hiperkeratose nevoide do mamilo e da aréola com epidemiologia atípica;
- Ressaltar a importância da correlação clínico-histopatológica para o diagnóstico correto.

Motivos da apresentação

- Ilustrar uma dermatose benigna pouco conhecida;
- Relatar um caso de hiperkeratose nevoide do mamilo e da aréola com epidemiologia atípica;
- Ressaltar a importância da correlação clínico-histopatológica para o diagnóstico correto.

Motivos da apresentação

- Ilustrar uma dermatose benigna pouco conhecida;
- Relatar um caso de hiperkeratose nevoide do mamilo e da aréola com epidemiologia atípica;
- Ressaltar a importância da correlação clínico-histopatológica para o diagnóstico correto.

Referências bibliográficas

Rui-Ni W et al. Bilateral hyperkeratosis of the nipples and areolae with linear nevus and acanthosis nigricans: A rare case report. *Skin Health Dis.* 2024; 27;4(2):e344.

Chao W et al. Skin diseases of the nipple and areola complex: A case series study from China. *Front Med (Lausanne).* 2023; 28:10:1136482;

Claudio C et al. Dermoscopic features of nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola. *Dermatol Pract Concept.* 2022; 12(1): e2022003;

Tomc CM et al. Resolved peristomal erosive papulonodular dermatitis mimicking nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola. *HCA Healthc J Med.* 2023; 28;4(3):243-248;

Munoz-Aceituno E et al. Focal nevoid hyperkeratosis of the nipple in a prepubertal girl. *Pediatr Dermatol.* 2019;36(2):247-248;

González-Hernández WC et al. Bilateral nipple neoformations. *JAAD Case Rep.* 2021; 8: 86–88;

Nishimura K et al. Spontaneous regression of long-standing bilateral nevoid hyperkeratosis of the nipple and areola in a young female: A case report. *J Dermatol.* 2021;48(4):e188-e189;

Ghanadan A et al. Nevoid Hyperkeratosis of the Nipple and/or Areola: Treatment with Topical Steroid. *Indian J Dermatol.* 2013; 58(5): 408;

Sander D et al. Hyperkeratosis of the nipple and areola: a histopathologic pitfall. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2018;16(11):1368-1370;

Huang Q et al. Dermoscopy and Histopathology of Hyperkeratosis of Nipple and Areola: A Case Report. *Clin Cosmet Investig Dermatol.* 2024; 15:17:649-652.

Obrigada!

