

# Subtipo raro de metástase cutânea

---

- Luyze de Sá Campos
- Georgia Zandomenico Perito
- Lícia Berberich Melo
- Gabriel Ricas Rezende
- Maria Julia Cavaler De Maman
- Alexander Richard Bauk

# Caso clínico

- **Identificação:** sexo feminino, 76 anos, residente em Queimados, do lar.
- **História da doença atual:** paciente em tratamento de câncer de mama há 3 anos, encaminhada do ambulatório de oncologia em janeiro deste ano devido a lesões violáceas no MSE e na mama esquerda. A mesma referiu que as lesões haviam iniciado em 2021 e queixava-se de dor e prurido.
- **História patológica pregressa:** HAS, carcinoma ductal inflamatório de mama esquerda (HER 2+ / RH -) com metástase para mama contralateral, nodal e possivelmente pleural.

# Caso clínico

- **Medicações de uso contínuo:** flunarizina, atenolol, losartana, espironolactona, furosemida, trastuzumabe.
  - QT anterior: docetaxel + trastuzumabe (2021 – 12/2023), capecitabina (05/23 – 12/23).
- **Exames laboratoriais:** nada digno de nota.



Jan/2024




Jan/2024

# Hipótesis diagnósticas


**Carcinoma  
hemorragiectoide**

**Sarcoma de Kaposi**


Linfangioma circunscrito




**Conduta**




**Biópsia da  
pele**



**Imuno-  
histoquímica**



# Exame histopatológico



# Imuno-histoquímica

1

Positividade para GATA 3

2

Negatividade para RE

# Carcinoma hemorragiectoide

---



Abril/ 2024



Abril/ 2024

# Metástase Cutânea



Eventos pouco frequentes na prática clínica



0,7 a 9% dos tumores sólidos fazem metástase para a pele



Apresentação clínica é diversa e pode simular doenças inflamatórias, tumores benignos ou tumores cutâneos malignos

# Mama

Sítio primário de maior frequência

# Metástase Cutânea

---

**O câncer de mama desenvolve metástases mais frequentemente para o tórax**



```
graph TD; A[O câncer de mama desenvolve metástases mais frequentemente para o tórax] --> B[Clinicamente, a forma mais comum de apresentação consiste em pápulas ou nódulos normocrômicos]; B --> C[Pode se manifestar como metástase de carcinoma inflamatório];
```

**Clinicamente, a forma mais comum de apresentação consiste em pápulas ou nódulos normocrômicos**

**Pode se manifestar como metástase de carcinoma inflamatório**

# Carcinoma metastático cutâneo inflamatório

| Feature                         | Carcinoma erysipelatoides                            | Carcinoma hemorrhagictoides               | Carcinoma telangiectoides                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cutaneous morphology            | Patch or plaque: erythematous and sharply demarcated | Indurated plaque: purpuric and violaceous | Patch: erythematous with prominent telangiectasias |
| Presence of tumor in the dermis | 0% to 3-5%; absent to minimal                        | 6% to >25%; mild to extensive             | 0% to 3-5%; absent to minimal                      |
| Vessel infiltrated by the tumor | Lymphatics                                           | Blood vessels or lymphatics or both       | Blood vessels                                      |



carcinoma hemorragiectoides



Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#)

[User Guide](#)

Save

Email

Send to

Sort by:

Best match



Display options

MY NCBI FILTERS

5 results



Page

1

of 1



Case Reports

> [Cutis](#). 2020 May;105(5):E20-E22.

## Cutaneous metastatic breast adenocarcinoma

Karen A Smith <sup>1</sup>, Juliana Basko-Plluska <sup>2</sup>, Anisha D Kothari <sup>1</sup>, Amy J Derick <sup>3</sup>

4 casos de  
carcinoma  
hemorragiectoide  
encontrados na  
literatura

# Carcinoma hemorragiectoide

- Os primeiros casos descritos foram em 2012 em dois homens com carcinoma metastático do ducto salivar.
- Posteriormente, em 2017 e em 2020, uma mulher com carcinoma de mama ductal invasivo e outra com adenocarcinoma de mama foram relatadas.

# Carcinoma hemorragiectoide

- O sinal do escudo é um achado peculiar.



# Seguimento do caso

---

- Paciente mantém acompanhamento pela oncologia.
- Programada a associação de capecitabina e pertuzumabe ao trastuzumabe.



Conclusão

# Referências

- Cohen PR, Prieto VG, Piha-Paul SA, Kurzrock R. The "shield sign" in two men with metastatic salivary duct carcinoma to the skin: cutaneous metastases presenting as carcinoma hemorrhagictoides. J Clin Aesthet Dermatol. 2012 Sep;5(9):27-36. PMID: 23050032; PMCID: PMC3460659.
- Cohen PR, Kurzrock R. Cutaneous Metastatic Cancer: Carcinoma Hemorrhagictoides Presenting as the Shield Sign. Cureus. 2021 Jan 11;13(1):e12627. doi: 10.7759/cureus.12627. PMID: 33585116; PMCID: PMC7872488.
- Cohen PR. Pleomorphic Appearance of Breast Cancer Cutaneous Metastases. Cureus. 2021 Dec 9;13(12):e20301. doi: 10.7759/cureus.20301. PMID: 35028206; PMCID: PMC8747974.
- Cullen Aravena R, Cullen Aravena D, Velasco MJ, Queirolo González A, Requena L. Carcinoma hemorrhagictoides: case report of an uncommon presentation of cutaneous metastatic breast carcinoma. Dermatol Online J. 2017 Jun 15;23(6):13030/qt3hm3z850. PMID: 28633745.
- Souza BC, Miyashiro D, Pincelli MS, San-ches JA. Cutaneous metástases from solid neoplasms. Literature review. An Bras Dermatol. 2023;98:571-9

Obrigada!

