



MELANOMAS NA PELE COM FOTODANO: Relato de casos

Miriã Vieira dos Santos Ferreira
Carlos Arthur de Figueiredo Athayde
Amanda do Carmo Gusmão
Stefanie Lai
Luciana Pantaleão
Isadora Ortiz Cantarino Pereira da Silva

CASO 01


Paciente masculino, 65 anos, história de carcinomas basocelulares, comparece ao ambulatório para avaliação global da pele.




CASO 01

Paciente masculino, 65 anos, história de carcinomas basocelulares, comparece ao ambulatório para avaliação global da pele.







Luz não polarizada




Luz não polarizada



Luz não polarizada




Luz polarizada




Luz polarizada

HISTOPATOLOGIA




HISTOPATOLOGIA




HISTOPATOLOGIA

Maior aumento:



HISTOPATOLOGIA

Maior aumento:



CASO 02


Paciente feminino, 56 anos, encaminhada para o ambulatório de dermatologia por quadro de eczema de contato.




CASO 02

Paciente feminino, 56 anos, encaminhada para o ambulatório de dermatologia por quadro de eczema de contato.







Luz polarizada





Luz polarizada



Luz polarizada




Luz polarizada




Luz polarizada

HISTOPATOLOGIA




HISTOPATOLOGIA




HISTOPATOLOGIA

Maior aumento:



HISTOPATOLOGIA

Maior aumento:



CASO 03


Paciente masculino, 74 anos, encaminhado à dermatologia para exérese de ceratose seborreica.



CASO 03


Paciente masculino, 74 anos, encaminhado à dermatologia para exérese de ceratose seborreica.






Luz polarizada


HISTOPATOLOGIA




HISTOPATHOLOGIA




HISTOPATOLOGIA



HISTOPATHOLOGIA



PELE COM FOTODANO CRÔNICO: RETIFICAÇÃO DA JUNÇÃO DERMEOEPIDÉRMICA



CRITÉRIOS DERMATOSCÓPICOS CLÁSSICOS




Network



Patchy network




**Peripheral
network & central
globules**



Globular



**Globular
Cobblestone**



**Reticular
Peripheral globules**



**Homogenous
blue**




**Homogenous
brown**

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



Lentigo solar



Ceratoze liquenóide

ARTIGO

Dermatoscopic features of cutaneous non-facial non-acral lentiginous growth pattern melanomas

Jeff Keir¹

¹ Department of Dermatology, School of Medicine, Cardiff University, Wales, UK; Northern Rivers Skin Cancer Clinic, Ballina, NSW, Australia



ARTIGO


SÉRIE DE CASOS


- 20 melanomas não faciais

3 critérios dermatoscópicos → aumentam detecção precoce de melanomas não faciais


- Lesão semelhante a lentigo solar com bordas mal delimitadas
- Pigmentação assimétrica de aberturas foliculares
- Estruturas poligonais









Lentigo solar



Lentigo maligno



Lentigo solar



Lentigo maligno

ARTIGO

Clinical and dermoscopic characteristics of melanomas on nonfacial chronically sun-damaged skin

Natalia Jaimes, MD,^a Ashfaq A. Marghoob, MD,^b Harold Rabinovitz, MD,^c Ralph P. Braun, MD,^d
Alan Cameron, MBBS,^e Cliff Rosendahl, MBBS, PhD,^e Greg Canning, MBBS,^f
and Jeffrey Keir, MBBS, MFamMed^g

*Medellín, Colombia; New York, New York; Plantation, Florida; Zürich, Switzerland;
and Brisbane, Townsville, and Ballina, Australia*

ARTIGO

SÉRIE DE CASOS

- 186 melanomas não faciais nos paciente com fotodano crônico

1 dos 3 padrões dermatoscópicos específicos foram vistos em 78% dos casos

- Ilhas periféricas pigmentadas
 - Centro da lesão: áreas brancas / estruturas cristalinas
- Linhas anguladas
- Peppering difuso



ARTIGO

SÉRIE DE CASOS

- 186 melanomas não faciais nos paciente com fotodano crônico

1 dos 3 padrões dermatoscópicos específicos foram vistos em 78% dos casos

- Ilhas periféricas pigmentadas
 - Centro da lesão: áreas brancas / estruturas cristalinas
- Linhas anguladas
- Peppering difuso




ARTIGO

SÉRIE DE CASOS

- 186 melanomas não faciais nos paciente com fotodano crônico

1 dos 3 padrões dermatoscópicos específicos foram vistos em 78% dos casos

- Ilhas periféricas pigmentadas
 - Centro da lesão: áreas brancas / estruturas cristalinas
- Linhas anguladas
- Peppering difuso




ARTIGO



SÉRIE DE CASOS

- 186 melanomas não faciais nos paciente com fotodano crônico


1 dos 3 padrões dermatoscópicos específicos foram vistos em 78% dos casos

- Ilhas periféricas pigmentadas
 - Centro da lesão: áreas brancas / estruturas cristalinas
- Linhas anguladas
- Peppering difuso









ARTIGO

Reyes GAMO-VILLEGAS¹
Uxúa FLORISTÁN-MURUZÁBAL¹
Ana PAMPÍN-FRANCO¹
Javier MARTÍN-ALCALDE¹
Francisco Javier
PINEDO-MORALEDA²
José Luis LÓPEZ-ESTEBARANZ¹
Salvador GONZÁLEZ³

Eur J Dermatol 2022; 32(4): 516-21

Dermoscopic changes in 22 extrafacial *in situ* and invasive lentiginous melanomas

¹ Dermatology Department, Hospital Fundación Alcorcón, Madrid, Spain


² Pathology Department, Hospital Fundación Alcorcón, Madrid, Spain

³ Medicine and Medical Specialties Department, Alcalá de Henares University, Madrid, Spain



ARTIGO





ESTUDO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO




- Acompanhamento de **22 melanomas** não faciais na pele com fotodano









- A. Perda do padrão reticular
- B. Focos de pigmentação irregular e presença de pontos e estruturas triangulares
- C. Linhas anguladas
- D. Áreas centrais com estruturas brancas brilhantes e vasos atípicos











OBJETIVOS DA APRESENTAÇÃO

- Ressaltar a importância dos critérios dermatoscópicos para detecção de melanomas na pele com fotodano.
 - Lesão semelhante a lentigo solar com bordas mal delimitadas
 - Pigmentação assimétrica de aberturas foliculares
 - Três padrões: linhas anguladas; áreas pigmentadas na periferia; peppering
- Destacar a importância do lentigo maligno extrafacial como diagnóstico diferencial de lesões benignas.
- Reforçar o cuidado da avaliação dermatoscópica completa do paciente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Braun, R. P.; Lallas A.; Marghoob, A. Revised two-step algorithm. Dermoscopedia, 2023. Disponível em: <https://dermoscopedia.org/w/index.php?title=Revised_two-step_algorithm&oldid=20625>. Acesso 21 jun/2024.
- Gamo-Villegas R, Floristán-Muruzábal U, Pampín-Franco A, Martín-Alcalde J, Pinedo-Moraleda FJ, López-Estebáranz JL, González S. Dermoscopic changes in 22 extrafacial in situ and invasive lentiginous melanomas. Eur J Dermatol 2022; 32(4): 516-21.
- Jaimes N, Marghoob AA, Rabinovitz H, Braun RP, Cameron A, Rosendahl C, Canning G, Keir J. Clinical and dermoscopic characteristics of melanomas on nonfacial chronically sun-damaged skin. J Am Acad Dermatol. 2015 Jun;72(6):1027-35.
- Keir J. Dermatoscopic features of cutaneous non-facial and non-acral lentiginous growth pattern melanomas. Dermatol Pract Concept. 2014;4(1):13.

OBRIGADA!

