



Hospital Central Aristarcho Pessoa
Serviço de Dermatologia



Diagnóstico incomum de lesão acral

Sofia Bugarim Fernandes
Gabriela Albuquerque
Natália Meireles
Marien Siqueira
Mara Mazzillo
Ana Cristina Fonseca Duarte Pinto



Caso Clínico

- **Identificação:** Sexo masculino, 63 anos, fototipo IV, natural e procedente do Rio de Janeiro.
- **Queixa Principal:** “Massa no pé”
- **HDA:** Paciente hipertenso com histórico de Covid-19 grave, permaneceu internado em CTI por 30 dias com dificuldade de deambulação associada à hemiparesia esquerda durante 3 meses. Nesse período, desenvolveu úlcera com posterior surgimento de placa vegetante no calcanhar esquerdo.

EXAME DERMATOLÓGICO



Placa hiperkeratótica com área verrucosa, bem delimitada, firme, de coloração eritematosa na região medial de calcanhar esquerdo, com aproximadamente 8 cm em seu maior diâmetro.

Foto Autorizada pelo paciente
Imagem do Serviço de Dermatologia do Hospital do Corpo de Bombeiros

DERMATOSCOPIA

- Lacunas rosas com septos claros
- Sem achados de Malignidade
- Ausência de vasos glomerulares





Foto Autorizada pelo paciente
Imagem do Serviço de Dermatologia do Hospital do Corpo de Bombeiros



Hipóteses Diagnósticas



Acantoma de células
claras



Carcinoma
espinocelular



Poroma



Verruga Vulgar



Ceratodermia plantar



Siringofibroadenoma
écrino





Hipóteses Diagnósticas



Acantoma de células
claras




Carcinoma
espinocelular



Poroma



Verruga Vulgar



Ceratodermia plantar




Siringofibroadenoma
écrino



Realizada biópsia Incisional
para avaliação histopatologica




ANATOMOPATOLÓGICO



1. Cordões anastomosados de células epiteliais cuboides dentro de um estroma fibrovascular

2. Disposição epiderme em direção à derme

ANATOMOPATOLÓGICO



Estruturas ductais e císticas
revestidas por células luminais.



História clínica
+
Exame dermatológico
+
Histopatologia



Siringofibroadenoma écrino




SIRINGOFIBROADENOMA ÉCRINO (SFAE)

- Tumor anexial raro e benigno
- Descrito por Mascaro em 1963
- Porção acrosiríngica do ducto Écrino
- Classificado por Starink e French, 1997
- 5 Subtipos



CLASSIFICAÇÃO



1

Solitárias

(Mais comuns:
Membros
inferiores de
pacientes idosos
Sem trauma
prévio)

2

Associadas a displasia ectodérmicas

(Schopf-Schulz-
Passarge
[SSPS])

3

Siringofibroade nomatose

(múltiplas lesões;
Mais extensas;
não associada à
SSPS)

4

Reativas

Inflamação/
feridas crônicas

5

Unilaterais Lineares

Lesões
Nevóides

- Starink, French -1997



Siringofibroadenoma écrino reativo



(eccrine syringofibroadenomas)



Search

Advanced Create alert Create RSS

User Guide

Save Email Send to

Sort by: Best match

Display options

MY CUSTOM FILTERS

105 results

Page 1 of 11

RESULTS BY YEAR



PUBLICATION DATE

Siringofibroadenoma écrino: relato de um caso atípico e comparação com 60 casos da literatura

Eccrine Syringofibroadenoma: Report of an Unusual Case and Review of 60 Cases of Literature

Cristhine Souza Leão^a, Wei YS^a, Nilceo Swery Michalany^b, Ival Peres Rosa^a,
Lizandra Santos Machado^a, Adriana Maria Porro^a

Hospital São Paulo. ^aDepartamento de Dermatologia. ^bDisciplina de Anatomia Patológica, Departamento de Morfologia.
Universidade Federal de São Paulo. São Paulo. Brasil.

Siringofibroadenoma ecrino reactivo secundario a pie diabético

Reactive eccrine syringofibroadenoma secondary to diabetic foot.



Dermatol Rev Mex. 2021; 65 (2): 278-281. <https://doi.org/10.24245/dermatolrevmex.v65i2.5605>

Lina Paola González-Cardona,¹ Juliana Ordóñez-Parra,¹ Maddy Mejía-Cortés,² Margarita Tamayo-Buendía¹

¹ Servicio de Dermatología.

² Servicio de Dermatopatología.

Pontificia Universidad Javeriana-Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, Colombia.



www.surgicalcosmetic.org.br/

Siringofibroadenoma écrino em paciente tetraplégico por mielite transversa

Eccrine syringofibroadenoma in a patient with quadriplegia following transverse myelitis

Relato de caso

Autores:

Luana Amaral de Moura¹
Lucia Martins Diniz¹
Emilly Neves Souza¹
Alexandre Calegari Oliosi¹
Marcela Scárdua Sabbagh de-Azevedo¹

DOI: 10.1016/j.abdp.2020.05.030

Open Access

Siringofibroadenoma écrino reativo desencadeado por dano térmico: relato de caso

Roberto Rheingantz da Cunha Filho^a, Lucas José Quioca^b, Graziela Junges Crescente Rastelli^c, José Fillus Neto^d

^a Faculdade de Medicina, Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba, SC, Brasil

^b Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba, SC, Brasil

^c Departamento de Patologia, Faculdade Evangélica Mackenzie Paraná, Curitiba, PR, Brasil

^d Departamento de Patologia Básica, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil

CARTAS - DERMATOPATOLOGIA

DOI: 10.1016/j.abdp.2024.02.014

Acesso de texto completo

Siringofibroadenoma écrino: dois relatos de casos exuberantes

Camila Schlang Cabral da Silveira, Luiz Felipe Oliveira Santos, Marcella Leal Novello D'Elia, Daniel Lago Obadia

Departamento de Dermatologia, Hospital Universitário Pedro Ernesto, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil



Como Ocorre Subtipo Reativo?





Tratamento do Siringofibroadenoma Écrino (ESFA):

Individualizado de acordo com **subtipo** clínico, tamanho da lesão e **sintomas**



CONSERVADOR

- Terapia tópica (corticosteroides).
- Cuidados com a pele e proteção local.
- Controle da causa subjacente.



CIRURGICO:

- Excisão seletiva ou completa.
- Crioterapia (casos específicos).





Tratamento do Siringofibroadenoma Écrino (ESFA):

Úlcera prévia, lesão única de 8cm, assintomática - Subtipo Reativo

CONSERVADOR

- Drenison Oclusivo
- Prevenção de úlceras
- Curativos protetores e calçados adequados
- Acompanhamento regular com dermatologista



ANTES



DEPOIS



Motivos da Apresentação

-  Raridade da doença
-  Importância do tratamento adequado de úlceras
-  Diagnóstico diferencial de tumores anexiais, evitando tratamentos desnecessários para lesões benigna
-  Contribuição científica



Referências

1. **Silveira CS, Santos LF, D'Elia ML, Obadia DL.** Eccrine syringofibroadenoma: report of two exuberant cases. *An Bras Dermatol.* 2024;99:467-71.
2. **Cunha Filho RR, Quioca LJ, Rastelli GJC, Fillus Neto J.** Reactive eccrine syringofibroadenoma triggered by thermal damage: case report. *An Bras Dermatol.* 2021;96:255-6.
3. **Komine M, Hattori N, Tamaki K.** Eccrine syringofibroadenoma (Mascaro): an immunohistochemical study. *Am J Dermatopathol.* 2000;22(2):171-5. doi: 10.1097/00000372-200004000-00015. PMID: 10770440.
4. **Schadt CR, Boyd AS.** Eccrine syringofibroadenoma with co-existent squamous cell carcinoma. *J Cutan Pathol.* 2007;34 Suppl 1:71-4. doi: 10.1111/j.1600-0560.2007.00740.x. PMID: 17997744.
5. **Andrade AC, Vieira DC, Harris OM, Pithon MM.** Clouston syndrome associated with eccrine syringofibroadenoma. *An Bras Dermatol.* 2014;89(3):504-6. doi: 10.1590/abd1806-4841.20142996. Erratum in: *An Bras Dermatol.* 2014;89(4):692. PMID: 24937830; PMCID: PMC4056714.
6. **Morais P, Guimarães M, Canelhas A, Azevedo F.** Pedunculated nodule on the foot. *Dermatol Online J.* 2012;18(4):5. Disponível em: <https://escholarship.org/content/qt68d742w1/article2.html>.
7. **França E.** Carcinoma espinocelular (CEC) [Internet]. Recife: Emmanuel França Dermatologia; 2015 [citado em 2024 Out 28]. Disponível em: <https://emmanuelfranca.com.br/carcinoma-espinocelular-cec/>.



Referências

8. **González-Cardona LP, Ordóñez-Parra J, Mejía-Cortés M, Tamayo-Buendía M.** Siringofibroadenoma ecrino reactivo secundario a pie diabético. *Dermatol Rev Mex.* 2021;65(2):278-81.
9. **Hays JP, Malone CH, Goodwin BP, Wagner RF Jr.** Reactive eccrine syringofibroadenoma associated with basal cell carcinoma: a histologic mimicker of fibroepithelioma of Pinkus. *Dermatol Surg.* 2018;44(5):738-40. doi: 10.1097/DSS.0000000000001308.
10. **Iqbal B, Khandekar P, Dey I, Kumar H.** Syringofibroadenoma: benign eccrine sweat gland tumor—a rare case report. *Indian J Dermatopathol Diagn Dermatol.* 2019;6:97-9.
11. **Primary Care Dermatology Society.** Epidermal naevi. *PCDS Clinical Guidance* [Internet]. Disponível em: <https://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/epidermal-naevi>.
12. **Shii N, Koga H, Teye K, Hamada T, Nakama T.** Eccrine syringofibroadenoma as a manifestation of ichthyosis follicularis-atrichia-photophobia syndrome-1. *Int J Dermatol.* 2024 Jul 11. doi: 10.1111/ijd.17383. Epub ahead of print. PMID: 38992317.
13. **Dantas BC, Castro LR, Alves NSM, Swiczar BCC, Valente NYS.** Pigmented eccrine syringofibroadenocarcinoma simulating malignant melanoma. *Na Bras Dermatol.* 2024;99:632---5
14. **Patil NK, Bubna AK, Hussain S, Joseph LD.** Eccrine Syringofibroadenoma: A Rare Skin Adnexal Tumor at a Rare Site. *J Cutan Aesthet Surg.* 2022 Jul-Sep;15(3):335-337. doi: 10.4103/JCAS.JCAS_28_21. PMID: 36561398; PMCID: PMC9764956.

Obrigada!

sofia.bugarim@yahoo.com.br